





## ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNĚ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ POUŽITÍ PRÍSTROJE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI NÁSTROJE.

### PROFIL ZAMÝŠLENÉHO UŽIVATELE:

Zamýšleným uživatelem je zdravotnický pracovník s licencí, pacient nebo pacientův pečovatel. Uživateli musí být schopni přenést veškeré požadavky, varování a upozornění v návodu k použití a porozumět jim a jejich významu a chopen je dodržovat.

### ÚČEL POUŽITÍ A INDIKACE:

Loketní ortéza AirCast Mayo Clinic zajišťuje imobilizaci nebo omezení pohybu lokte.

**KONTRAINDIKACE:** Loketní ortéza Mayo Clinic se nesmí používat u pacientů s vaskulárními nebo neurovaskulárními poruchami.

**VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ:** Produkt musí předepsat a nasadit zdravotnický pracovník. • Pokud se v vás po kontaktu se kteroukoli částí produktu objeví reakce (alergie) nebo svědění, zarudnutí kůže, přestaňte prostředek používat a okamžitě se obraťte na zdravotnického pracovníka. • Nepřikládáje na otevřeně rány. • Nadměrné utažení popruhů ortézy může narušit krevní oběh. Pokud pociťujete brnění nebo znečištění, popruhy uvolněte. • Nepoužívejte prostředek, je-li poškozen a/nebo byl-li jeho obal otevřen. • Pokud se během používání tohoto produktu objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné nevyžádané reakce, okamžitě se obraťte na svého lékaře.

**POZNÁMKA:** Pokud kvůli použití tohoto prostředku dojde k závažné nežádoucí příhodě, oznamte ji výrobci a příslušnému orgánu.

### INFORMACE O APLIKACI:

**APLIKACE ORTÉZY (alternativní způsob aplikace naleznete na spodní části stránky)** Ortéza má čtyři popruhy a čtyři vzduchové těleska pro podporu a stabilizaci pažního kloubu a upevnění ortézy k paži. Dva další vzduchové polštářky jsou součástí loketní ortézy Mayo Clinic a lze je přidat do spodní části popruhů předlokti a bicepsu.

Jestliže přidáte vzduchové polštářky, ujistěte se, že šedá strana oboustranné kůže protáhnete popruhy skrz smyčky na černé straně vzduchového polštářku. Tyto vzduchové polštářky poskytnou další oporu a pomoc při udržení polohy ortézy v součastí s malou paží.

• Připnevněte dvě kruhové podložky (poučtá ortézy) na vnější straně vzduchového polštářku. Velký vankýš je připojený k ubi kontrolným gombíkem a malý vankýšik je připojený k opanáčmu kibu.

• Nastavte ovládací knoflík do odlobovací polohy.

• Otvárejte zářezky z kloubu ortézy pomocí imbusového klíče (součást ortézy).

• Odepněte všechny čtyři popruhy a vlože paže do ortézy. Podpěra s modrou látkou by měla být umístěna směrem k rameni a černá vnitřní podložka zůstane v přední části knoflík by se měla umístit na obě strany loketního kloubu (Obr. 1).

• Zajistěte čtyři popruhy v následujícím pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps.

• Upravte každý popruh na predklatě a biceps zarovnáte klb ortézy a kontrolný gombík a sáknout záchytný popruh.

• Otvorete všechny čtyři popruhy a polože ruku do ortézy. Držák z modré látky by měl být umístěn směrem k rameni a černý držák z bílého zářezku by měl být umístěn směrem k pažím. Ujistěte se, že každá strana loketního kloubu (Obr. 1).

• Upevněte čtyři popruhy v následovném pořadí: zápěstí, rameno, predklatě a biceps.

• Upravte každý popruh na predklatě a biceps zarovnáte klb ortézy a kontrolný gombík a sáknout záchytný popruh. Upravte horní či dolní část popruhů (popruhy sú na obou stranách).

• Je-li to nutné, vlože zářezky do kloubu pomocí imbusového klíče (součást ortézy) (Obr. 3). Zářezky lze v odlobovací poloze upravit na omezení rozsáh pohybu (ROM).

**ALTERNATIVNÍ METODA APLIKACE (Tato alternativní metoda aplikace je navrhována pacientům, kteří by mohli mít potíže se zašitím popruhů loketní ortézy Mayo Clinic nebo nedominantní ruce, nebo mají funkční omezení horních končetin).**

• Uvolněte všechny popruhy a nezapojte je úplně. Opakrně vsuňte paže do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps. **PRÍDÁVNÝ ZÁVĚS PÁŽE** Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídavný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

**APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED NÁSLEDUJÍCÍMI KROKY:**

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nepřibíže u těla. Obtočte konec závěsu se smyčkou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s modrou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapojte je úplně. Opakrně vsuňte paže do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps. **PRÍDÁVNÝ ZÁVĚS PÁŽE** Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídavný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

**APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED NÁSLEDUJÍCÍMI KROKY:**

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nepřibíže u těla. Obtočte konec závěsu se smyčkou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s modrou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapojte je úplně. Opakrně vsuňte paže do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps. **APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED NÁSLEDUJÍCÍMI KROKY:**

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nepřibíže u těla. Obtočte konec závěsu se smyčkou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s modrou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapojte je úplně. Opakrně vsuňte paže do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps. **PRÍDÁVNÝ ZÁVĚS PÁŽE** Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídavný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

**APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED NÁSLEDUJÍCÍMI KROKY:**

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nepřibíže u těla. Obtočte konec závěsu se smyčkou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s modrou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapojte je úplně. Opakrně vsuňte paže do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps. **PRÍDÁVNÝ ZÁVĚS PÁŽE** Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídavný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

**APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED NÁSLEDUJÍCÍMI KROKY:**

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nepřibíže u těla. Obtočte konec závěsu se smyčkou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s modrou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapojte je úplně. Opakrně vsuňte paže do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps. **PRÍDÁVNÝ ZÁVĚS PÁŽE** Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídavný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

**APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED NÁSLEDUJÍCÍMI KROKY:**

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nepřibíže u těla. Obtočte konec závěsu se smyčkou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s modrou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapojte je úplně. Opakrně vsuňte paže do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps. **PRÍDÁVNÝ ZÁVĚS PÁŽE** Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídavný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

**APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED NÁSLEDUJÍCÍMI KROKY:**

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nepřibíže u těla. Obtočte konec závěsu se smyčkou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s modrou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapojte je úplně. Opakrně vsuňte paže do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps. **PRÍDÁVNÝ ZÁVĚS PÁŽE** Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídavný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

**APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED NÁSLEDUJÍCÍMI KROKY:**

## SLOVENČINA

PRED POUŽITJEM TOHOTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČITAJTE CELE NÁSLEDUJUCE INSTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITJE PRÍSTROJA JE NEZBYTNÉ ZA NEKORAKNE FUNKCIJE NÁSTROJA.

### PROFIL ZAMÝŠLENÉHO POUŽIVATEĽA

Zamýšleným použivateľom je zdravotnícky pracovník, pacient alebo pacientov opatrovateľ. Použivateľ musí byť schopný prenásť všetky požiadavky, varovania a upozornenia v návode na použitie a porozumieť im a ich významu a byť ochotný ich dodržiavať.

### ÚČEL POUŽITIA A INDIKÁCIE:

Loketná ortéza AirCast Mayo Clinic poskytuje znehybnenie alebo regulovanie pohybu loktu.

**KONTRAINDIKÁCIE:** Loketná ortéza Mayo Clinic sa nesmie používať u pacientov s vaskulárnymi alebo neurovaskulárnymi poruchami.

**VAROVÁNIA A UPOZORNENIA:** Tento produkt musí predpísať a nasadiť zdravotnícky pracovník. • Pokiaľ sa u vás po kontakte s ktoroukoľvek časťou produktu objaví reakcia (alergia) alebo svrbenie, začnite používať prostriedok používať a okamžite sa obráťte na zdravotníckeho pracovníka. • Neprikladajte na otvorené rany. • Nadmerné utiahnutie popruhov ortézy môže narušiť krvný obeh. Pokiaľ pociťujete brnienku alebo znečistenie, popruhy uvoľnite. • Nepoužívajte prostriedok, ak je poškodený a/alebo bol jeho obal otvorený. • Pokiaľ sa počas používania tohto produktu objaví bolesť, opuchnutie, zmena citlivosti alebo iné nevyžiadane reakcie, okamžite sa obráťte na svojho lekára.

**POZNÁMKA:** Pokiaľ kvôli použitiu tohto prostriedku dojde k závažnej nežiadúcej príhode, oznámte ju výrobcovi a príslušnému orgánu.

### INFORMÁCIE O APLIKACI:

**APLIKÁCIA ORTÉZY (alternatívny spôsob aplikácie naleznete na spodní části stránky)** Ortéza má čtyři popruhy a čtyři vzduchové těleska pro podporu a stabilizaci pažního kloubu a upevnění ortézy k paži. Dva další vzduchové polštářky jsou součástí loketní ortézy Mayo Clinic a lze je přidat do spodní části popruhů předlokti a bicepsu.

Jestliže přidáte vzduchové polštářky, ujistěte se, že šedá strana oboustranné kůže protáhnete popruhy skrz smyčky na černé straně vzduchového polštářku. Tyto vzduchové polštářky poskytnou další oporu a pomoc při udržení polohy ortézy v součastí s malou paží.

• Připnevněte dvě kruhové podložky (poučtá ortézy) na vnější straně vzduchového polštářku. Velký vankýš je připojený k ubi kontrolným gombíkem a malý vankýšik je připojený k opanáčmu kibu.

• Nastavte ovládací knoflík do odlobovací polohy.

• Otvárejte zářezky z kloubu ortézy pomocí imbusového klíče (součást ortézy).

• Odepněte všechny čtyři popruhy a vlože paže do ortézy. Podpěra s modrou látkou by měla být umístěna směrem k rameni a černá vnitřní podložka zůstane v přední části knoflík by se měla umístit na obě strany loketního kloubu (Obr. 1).

• Zajistěte čtyři popruhy v následovném pořadí: zápěstí, rameno, předklatě a biceps.

• Upravte každý popruh na predklatě a biceps zarovnáte klb ortézy a kontrolný gombík a sáknout záchytný popruh.

• Otvorete všechny čtyři popruhy a polože ruku do ortézy. Držák z modré látky by měl být umístěn směrem k rameni a černý držák z bílého zářezku by měl být umístěn směrem k pažím. Ujistěte se, že každá strana loketního kloubu (Obr. 1).

• Upevněte čtyři popruhy v následovném pořadí: zápěstí, rameno, predklatě a biceps.

• Upravte každý popruh na predklatě a biceps zarovnáte klb ortézy a kontrolný gombík a sáknout záchytný popruh. Upravte horní či dolní část popruhů (popruhy sú na obou stranách).

• Je-li to nutné, vlože zářezky do kloubu pomocí imbusového klíče (součást ortézy) (Obr. 3). Zářezky lze v odlobovací poloze upravit na omezení rozsáh pohybu (ROM).

**ALTERNATIVNÍ METODA APLIKACE (Tato alternativní metoda aplikace je navrhována pacientům, kteří by mohli mít potíže se zašitím popruhů loketní ortézy Mayo Clinic nebo nedominantní ruce, nebo mají funkční omezení horních končetin).**

• Uvolněte všechny popruhy a nezapojte je úplně. Opakrně vsuňte paže do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps. **PRÍDÁVNÝ ZÁVĚS PÁŽE** Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídavný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

**APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED NÁSLEDUJÍCÍMI KROKY:**

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nepřibíže u těla. Obtočte konec závěsu se smyčkou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s modrou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapojte je úplně. Opakrně vsuňte paže do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps. **PRÍDÁVNÝ ZÁVĚS PÁŽE** Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídavný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

**APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED NÁSLEDUJÍCÍMI KROKY:**

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nepřibíže u těla. Obtočte konec závěsu se smyčkou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s modrou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapojte je úplně. Opakrně vsuňte paže do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps. **PRÍDÁVNÝ ZÁVĚS PÁŽE** Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídavný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

**APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED NÁSLEDUJÍCÍMI KROKY:**

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nepřibíže u těla. Obtočte konec závěsu se smyčkou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s modrou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapojte je úplně. Opakrně vsuňte paže do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps. **PRÍDÁVNÝ ZÁVĚS PÁŽE** Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídavný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

**APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED NÁSLEDUJÍCÍMI KROKY:**

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nepřibíže u těla. Obtočte konec závěsu se smyčkou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s modrou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapojte je úplně. Opakrně vsuňte paže do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps. **PRÍDÁVNÝ ZÁVĚS PÁŽE** Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídavný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

**APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED NÁSLEDUJÍCÍMI KROKY:**

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nepřibíže u těla. Obtočte konec závěsu se smyčkou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s modrou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapojte je úplně. Opakrně vsuňte paže do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps. **PRÍDÁVNÝ ZÁVĚS PÁŽE** Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídavný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

**APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED NÁSLEDUJÍCÍMI KROKY:**

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nepřibíže u těla. Obtočte konec závěsu se smyčkou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s modrou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapojte je úplně. Opakrně vsuňte paže do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps. **PRÍDÁVNÝ ZÁVĚS PÁŽE** Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídavný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

**APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED NÁSLEDUJÍCÍMI KROKY:**

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nepřibíže u těla. Obtočte konec závěsu se smyčkou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s modrou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapojte je úplně. Opakrně vsuňte paže do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps. **PRÍDÁVNÝ ZÁVĚS PÁŽE** Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídavný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

## DANSK

LES FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGENNEM FØR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FØR, AT ANORDNINGEN FUNKERER KORREKT.

### TILSIGTET BRUGERPROFIL:

Den tilsigtede bruger skal være en autoriseret læge, patienten eller patientens omsorgsperson. Brugeren skal kunne læse, forstå og være fysisk i stand til at udføre anvisningerne, advarsler og forholdsregler og forstå betydningen af brugsanvisningerne.

### BEREGET ANVENDING/INDIKATIONER:

AirCast Mayo Clinic albueskinne er beregnet til immobilisering eller kontrollet bevægelse af albuen.

**KONTRAINDIKATIONER:** Mayo Clinic albueskinne må ikke anvendes på personer med vaskulære eller neurovaskulære lidelser.

**ADVARSLER OG FORHOLDNINGER:** Dette produkt skal ordineres og tilpasses af en læge. • Hvis du får allergisk reaktion og/eller oplever ubehag, rødme eller svulst, eller hvis du har kontakt med någon del af dette instrument skal du slutte anvendelse med. • Må ikke anvendes over åbne sår. • Hvis skinneremmen strammes for meget, kan det kompromittere blodcirkulation. Ved snurren eller følelsesløshed skal remmen løsnes. • Brug ikke denne anordning, hvis den er beskadiget, og/eller emballagen har været åbnet.

• Hvis der opstår smerter, hævelser, feberføltesyrer eller andre usædvanlige reaktioner ved anvendelse af dette produkt, skal du når du anvender produktet, må du kontakte din læge.

**Bemærk:** Kontakt producenten og den kompetente myndighed i tilfælde af, at der opstår en alvorlig hændelse som følge af hændelsen eller en alvorlig skade.

**ANVENDELSESFORHOLDNING:**

**PÅFØR SKINNEN (Se nedenfor på siden for alternativ anvendelsesmetode)** Skinnen har fire remme med fire luffetter, som sikrer en behagelig og sikker fastgørelse af