

ARTROSTAR®

COMPACT II

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

wir freuen uns, dass Sie sich für ARTROSTAR® Compact II, ein Qualitätsprodukt von Enovis entschieden haben. Enovis ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Orthopädie und Medizintechnik. Wir bieten ein einzigartig vielfältiges Spektrum an orthopädischen Hilfsmitteln und physikalischen Therapiekonzepten, die sich systematisch ergänzen. Unsere Nahrungsergänzungsmittel werden nach dem anspruchsvollen europäischen HACCP-Standard und den strengen deutschen GMP-Richtlinien entwickelt und hergestellt.

In diesem Packungsbeileger finden Sie wichtige Informationen zum Produkt und wichtige Hinweise zur Verwendung von ARTROSTAR® Compact II.

Was ist ARTROSTAR® Compact II?

ARTROSTAR® Compact II ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit Glucosamin, Chondroitin, Kollagenhydrolysat, Hyaluronsäure, Vitaminen und Mineralstoffen. Enthält Süßungsmittel.

Wie wende ich ARTROSTAR® Compact II an?

ARTROSTAR® Compact II ist zwei Mal täglich einzunehmen:

- Morgens das Pulver in ein Glas geben und mit beliebiger Menge stillem Wasser oder Fruchtsaft aufgießen. Zu oder nach der Mahlzeit einnehmen.
- Abends die zwei Kapseln des Beutels für die Abendportion mit reichlich Flüssigkeit zu oder nach der Mahlzeit einnehmen.

Wie lange soll ARTROSTAR® Compact II eingenommen werden?

Mikronährstoffe werden täglich vom Körper gebraucht, eine regelmäßige Verwendung über einen längeren Zeitraum ist daher empfehlenswert.

Was muss ich bei der Anwendung von ARTROSTAR® Compact II beachten?

- Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
- Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
- Wenn Sie blutverdünnende Arzneimittel – insbesondere mit dem Wirkstoff Phenprocoumon (z.B. Marcumar®) oder anderen Vitamin-K-Gegenspielern – einnehmen müssen, sollten Sie Ihren Blutgerinnungswert regelmäßig prüfen und gegebenenfalls mit Ihrem Arzt Rücksprache nehmen.
- Wenn Sie an Störungen der Glucosetoleranz (Diabetes) leiden, können häufigere Kontrollen des Blutzuckerspiegels zu Beginn der Anwendung sinnvoll sein.
- Wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Schalentiere sind, sollten Sie mit der Anwendung von ARTROSTAR® Compact II vorsichtig sein, da das darin enthaltene Glucosamin aus Schalentieren gewonnen wird.
- Für Kinder, Schwangere und Jugendliche nicht geeignet.
- Die Morgenportion von ARTROSTAR® Compact II enthält Aspartam – eine Quelle für Phenylalanin.
- Der Verzehr von ARTROSTAR® Compact II kann zu Blähungen, Völlegefühl, im Einzelfall auch zu Verstopfung oder Durchfall führen.

ARTROSTAR®

COMPACT II

ARTROSTAR® Compact II ist frei von:

- Gluten
- Laktose

Wie lagere ich ARTROSTAR® Compact II?

Bewahren Sie ARTROSTAR® Compact II bitte bevorzugt kühl und trocken sowie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

ARTROSTAR® Qualitätsgarantie:

ARTROSTAR® wird in Deutschland von zertifizierten Unternehmen hergestellt und vertrieben.

Zur ARTROSTAR®-Qualitätsgarantie gehört die Herstellung nach den in Deutschland geltenden, strengen Richtlinien für Nahrungsergänzungsmittel (HACCP, GMP).

Sollten Sie trotzdem einmal einen berechtigten Grund zur Beanstandung haben, wenden Sie sich bitte unter Angabe des Grundes an Ihre Bezugsquelle oder direkt an den Enovis Kundenservice.

Wo erhalte ich weitere Informationen?

Wenn Sie weitere Fragen zu den in ARTROSTAR® Compact II enthaltenen Mikronährstoffen haben, wenden Sie sich gerne an uns. Wir stehen Ihnen für Fragen gerne montags bis freitags von 08.30–16.30 Uhr unter der Nummer: **01805 167 633** zur Verfügung.

Inhaltsstoffe und Zusammensetzung finden Sie auf der Außenseite der Packung.